

Colecalciferol ARISTO®

20.000 I.E.



Zur Behandlung eines
Vitamin-D₃-Mangels

- * Einnahme 1× wöchentlich 1 Weichkapsel
- * Weichkapsel enthält ausschließlich Rindergelatine
- * Auch bei Erdnuss- und Soja-Allergie geeignet

Bis zu
17%

Preisvorteil²
vs. Erstanbieter

NEU 36 Monate Haltbarkeit



Indikationsgerecht
kassenärztlich erstattungsfähig¹

**Dekristol®
20.000 I.E.**

Packungsgröße	AVP/€	PZN
50 Stk. (N2)	37,28 ³	04007393

**Colecalciferol Aristo®
20.000 I.E.**

AVP/€	PZN
31,02³	13980402

Preisvorteil 6,26 €²

¹ Initialbehandlung eines symptomatischen Vitamin-D-Mangelzustands bei Erwachsenen.

² Im Vergleich zum Apothekenverkaufspreis (AVP) des Erstanbieters; 20.000 I.E. / 50 Stück, Packungsgröße N2.

Stand Lauer-Taxe: 01.04.2024; GKV-Herstellerabschläge und Rabattverträge sind nicht berücksichtigt.

³ Stand Lauer-Taxe: 01.04.2024 / Erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Colecalciferol Aristo® 20.000 I.E. Weichkapseln (Rp). Wirkstoff: Colecalciferol (entsprechend 20.000 I.E. Vitamin D3). **Zus.:** 1 Weichkps. enth. 500 µg Colecalciferol (entsprechend 20.000 I.E. Vitamin D3). Sonst. Bestand. Kps.-inhalt: Mittelkettige Triglyceride, all-rac-alpha-Tocopherolacetat (Ph. Eur.); Kps.-hülle: Gelatine, Glycerol, Lösung von partiell dehydratisiertem Sorbitol (Ph. Eur.) [E 420], Gereinigtes Wasser. **Anw.:** Initialbehandlung eines symptomatischen Vitamin D-Mangelzustands bei Erwachsenen. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; Krankheiten oder Zustände, die zu einer Hyperkalzämie und/oder Hyperkalzurie führen; Pseudohypoparathyreoidismus; Hypervitaminose D; Nierensteine; Nephrokalzinose; schwere Nierenfunktionsstörung. **Schwangersch./Stillzeit:** Anwendung nicht empfohlen (sondern ein niedriger dosiertes Präparat). **Nebenw.:** Gelegentlich: Hyperkalzämie und Hyperkalzurie. Selten: Pruritus, Exanthem und Urticaria. Nicht bek.: Obstipation, Flatulenz, Übelkeit, Abdominalschmerzen, Diarrhö. Abhängig von Dosis und Behandlungsdauer kann eine schwerwiegende und lang anhaltende Hyperkalzämie mit ihren akuten (Herzrhythmusstörungen, Übelkeit, Erbrechen, psychische Symptome, Bewusstseinsstörungen) und chronischen (vermehrter Harndrang, verstärktes Durstgefühl, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Nierensteine, Nierenverkalkung, Verkalkung in Geweben außerhalb des Knochens) Folgen auftreten (sehr selten sind tödliche Verläufe beschrieben worden). Enthält Sorbitol. Packungsbeilage beachten. (verschreibungspflichtig). (Stand Juli 2023). **Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin.**